

Enostavna uporaba

Navodila za uporabo

Pred tretiranjem	Uporablja se lahko v kokošnjakih ob prisotnosti kokoši. Pred tretiranjem odstranite vsa jajca. Da bi izboljšali učinkovitost pripravka na tretirani površini, pred tretiranjem odstranite vso opremo, pod katero bi se paraziti lahko skrivali.
Odmerek	Harmonix® Red Mite je koncentrat, zato ga je potrebno razredčiti v razmerju 0,5 L pripravka Harmonix® Red Mite na 3,75 L vode za 100 m ² .
Priprava razpršilca in škropilne brozge	Tretira se z nizkotlačnimi razpršilci, ki lahko ustvarijo usmerjeno grobo pršenje (naramne ročne pršilke, ki jih, v kolikor so bile uporabljene za tretiranje z FFS-ji, predhodno operemo z detergentom in izperemo s čisto vodo). Ob tretiranju nastavimo nizek tlak pršilke na 1–2 Bara. Če tretiranje prekinete, pripravljeno mešanico pred uporabo ponovno pretresite.
Aplikacija	Veliko pozornosti namenite razpokam, vogalom in drugim ozkim prostorom, kjer se lahko skrivajo insekti. Vpojne površine zahtevajo višjo stopnjo nanosa škropilne brozge. Takoj po nanosu mora biti tretirana površina mokra. Harmonix® Red Mite se ne sme uporabljati neposredno na kokoših. Tretiranje priporočamo izvesti v večernem času, saj so takrat pršice aktivnejše (prilezejo iz skritih mest, razpok itd.)
Opomba	Uporabo pripravka Harmonix® Red Mite ponovite po 7–10 dneh po prvem nanosu ali ob prvih znakih ponovne okužbe.

Harmonix® Red Mite se lahko uporablja v kokošnjakih ob navzočnosti kokoši.

Harmonix® Red Mite je polimer iz celuloze, oblikovan kot specifično topilo, ki lahko prodre v prašne plasti, ki jih pogosto najdemo v kokošnjakih. Z lahkoto se razširi globoko v razpoke kjer so paraziti (rdeča pršica, »tekuti« in drugi). Celulozni polimer deluje kot lepljiva tekoča mikro pasta, ki tvori film, ki bo imobiliziral vse parazite, ki posledično odmrejo.

Uporablja se lahko na prevozni in drugi opremi za transport kokoši in ostale perutnine na druga območja, saj le-ta predstavljajo največje tveganje za okužbo.

